

Dépistage de l'insuffisance rénale chronique chez le chat

*L'insuffisance rénale chronique est une maladie fréquente chez le chat.
En effet 15% des chats de plus de 12 ans sont atteints par cette maladie*

Comment apparait cette maladie?

Chaque animal naît avec un capital rénal. Tous les animaux ne sont pas égaux dès la naissance.

Ce capital diminue avec l'âge, certaines maladies, l'utilisation de certains médicaments, l'activité physique intense...

Quels sont les signes de cette maladie ?

Le signe le plus précoce de la défaillance rénale est la présence de protéines dans les urines détectable uniquement par une analyse d'urine

C'est à ce stade que les mesures préventives permettront d'augmenter l'espérance de vie de votre animal

Les signes visibles sur l'animal apparaissent lorsque plus de 75% du capital rénal a disparu :

- Augmentation de la prise de boisson et d'émission d'urine
- Vomissements et diarrhée
- Maigrissement

Lorsque les symptômes sont détectables, les mesures de prévention sont beaucoup moins efficaces.

Comment dépister cette maladie ?

Le moyen le plus précoce pour détecter l'insuffisance rénale est la **recherche de protéines dans les urines.**

Cet examen nécessite de prélever l'urine directement dans la vessie éventuellement sous anesthésie et sous contrôle échographique

En conclusion, l'insuffisance rénale est la maladie la plus fréquente chez le chat âgé.

C'est pourquoi nous vous proposons de réaliser un dépistage précoce de cette pathologie dès l'âge de 9 ans pour mettre en place les mesures nécessaires pour prolonger l'espérance de vie de votre chat