



Le complexe gingivo-stomatite chronique féline est un ensemble d'affections buccales caractérisées par une inflammation chronique de la bouche.

Cette inflammation provoque une douleur importante lors de la prise alimentaire. Dans certains cas, le chat ne peut plus s'alimenter.



Quels sont les causes de cette maladie ?

Cette maladie serait due à une inflammation excessive de la gencive en réponse à une agression.

Les causes sont très souvent multiples :

- Des virus : un calicivirus (agent également du coryza) pouvant être associé aux virus du Sida du chat et/ou de la leucose féline
- La plaque dentaire ; le tartre et les atteintes dentaires
- Des troubles immunitaires

Comment identifier cette maladie ?

Les signes cliniques les plus souvent observés au niveau de la cavité buccale sont :

- Une **inflammation** des gencives très importante notamment au niveau des molaires et du fond de la bouche
- Une **douleur** à l'ouverture de la bouche et lors de la prise de nourriture
- Des ganglions de taille augmentée
- Une **diminution voire un arrêt de la prise alimentaire**

Prise en charge de cette maladie

*Le but des traitements est de **diminuer la fréquence et l'intensité des crises**. Il est souvent compliqué d'éradiquer totalement la maladie.*

Mise en évidence des causes prédisposantes :

- **Un examen de la cavité buccale** sous anesthésie générale est souvent nécessaire pour visualiser l'ensemble des lésions surtout si la douleur est importante.
- **Un dépistage du sida du chat et de la leucose** par une prise de sang (résultat en 10 minutes).
- **Mise en évidence des calicivirus** par un prélèvement buccal et une recherche virale.



L'objectif des traitements est le contrôle de l'inflammation et de la douleur :

- Traitements médicaux :

- Anti-inflammatoires et antalgiques
- Antibiotiques
- Régulateurs de la réponse immunitaire

- Soins dentaires

- Détartrage
- Extractions dentaires multiples pour supprimer l'inflammation liée à la plaque dentaire et au tartre



Les traitements sont en général longs et nécessitent un suivi régulier pendant au moins 6 mois.

La prise en charge doit être adaptée au cas par cas.

Prévention :

- Vaccination contre les maladies virales
- Hygiène dentaire (cf fiche spécifique sur l'hygiène dentaire)
- Surveillance régulière de la dentition
- Suivi de l'évolution de la maladie

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler.