


La lactation nerveuse chez la chienne

La lactation nerveuse correspond à **une montée de lait et à des modifications du comportement de la chienne entre 6 et 12 semaines après les chaleurs**. Environ 50% des chiennes non stérilisées serait touchées.

La lactation nerveuse est un phénomène qui **peut récidiver** lors des chaleurs suivant la première apparition.

Origine de la lactation nerveuse

Le cycle hormonal de la chienne présente plusieurs phases décrites ci-dessous :



Après ses chaleurs, la chienne mime au niveau hormonal une gestation (qu'il y ait fécondation ou non).

Ainsi **deux mois après ses chaleurs**, une chienne non gestante **peut présenter une lactation**. Cette maladie est due à une surexpression de l'activité hormonale de la chienne.

Symptômes de la lactation nerveuse

- Une **augmentation du volume des mamelles** et une **production de lait +/- importante**.
- Des **modifications du comportement** : une prostration, de l'agitation, une agressivité ou des vocalises.
- Un **développement d'un comportement maternel** en l'absence de mise bas : préparation d'un nid, adoption d'objets...
- Des **troubles digestifs** : baisse d'appétit, anorexie, parfois vomissements ou diarrhée.

Les chiennes présentant des lactations nerveuses seraient **prédisposées aux tumeurs mammaires**.

Traitement médical de la lactation nerveuse

Des molécules inhibant la lactation chez la chienne existent en **comprimés** ou en **solution buvable**.

Il est nécessaire de réaliser un traitement sur **4 jours consécutifs** accompagné d'une **mise à la diète** de la chienne (en laissant de l'eau à disposition). Il peut être nécessaire de renouveler le traitement une fois en cas de persistance des symptômes.

Il est important de **ne pas toucher aux mamelles** lors de traitement de lactation nerveuse car cela pourrait stimuler la montée de lait.

Ses molécules peuvent avoir des **effets secondaires** comme des vomissements, de la diarrhée ou des modifications du comportement (excitation, agitation..).

- ✓ **La stérilisation de la chienne est conseillée lors de lactation nerveuse pour limiter les récives.**