

La rétention d'œuf chez les oiseaux

Le rétention d'œuf ou « mal de ponte » est un problème très fréquent chez les femelles de nos oiseaux de volière notamment les canaris et les perruches



Origine

Les rétentions d'œufs ont de nombreuses causes, parmi elles les plus fréquentes sont :

- Un déséquilibre de l'alimentation notamment un manque de calcium
- Des œufs malformés ou cassés dans l'appareil génital de la femelle
- Des pontes trop fréquentes
- L'obésité
- Une infection de l'appareil génital
- Le stress

Les signes de la rétention d'œuf

La femelle est triste retirée, dans un coin de la cage. Elle présente un abdomen en « boule », elle ne vole plus, a du mal à respirer...

Elle tente de pondre sans succès (mouvements de la queue de bas en haut répétés).

On peut sentir à travers l'abdomen l'œuf bloqué mais il faut faire très attention à ne pas le casser.

Une radiographie peut confirmer le diagnostic



Quoi faire lors de rétention d'oeuf ?

Quelques mesures simples sont à mettre en œuvre si la femelle est en forme :

- Augmenter la température et l'humidité de la cage : 28-30°C pendant 1 à 3 heures sur une serviette humide
- La faire boire
- Mettre une à deux gouttes d'huile de paraffine dans le cloaque

Si elle présente une franche baisse de forme, il faut appeler le vétérinaire pour la prendre en charge.